

# Les femelles : de la gestation au sevrage des chiots

## La gestation

La durée de gestation est approximativement de 63 jours à partir de la date d'ovulation.

Durant cette période, bien sûr la chienne va subir des modifications physiques et son alimentation va devoir être adaptée.

Si votre chienne est déjà au cru, vous n'aurez pas de gros changements à effectuer, mais plutôt quelques ajustements. Si votre chienne est nourrie aux croquettes et qu'elle est au tout début de sa gestation (jusqu'à 6 semaines), il est temps de changer son alimentation. Mais attention, pour elle, pas de jeûne ! Donnez le dernier repas de croquettes le soir et le lendemain débutez le cru en suivant la « procédure habituelle », puis en introduisant les différentes viandes petit à petit.

Au delà de 2 mois de gestation, attendez le sevrage des chiots pour débiter la transition pour la mère et ses petits.

- **Deuxième semaine de gestation :**

Il est conseillé de diminuer la quantité de foie de moitié pour éviter un excès de vitamine A qui serait [néfaste](#) au bon développement des fœtus. Toutefois si vous respectez les 5 % de foie quotidien il n'y a pas de raison qu'il y ait de surdosage.

- **Dès la troisième semaine de gestation:**

Privilégiez les viandes un peu plus grasses comme le canard et le mouton.

- **Quatrième semaine de gestation:**

Commencez à augmenter progressivement la quantité quotidienne pour atteindre 4 à 5 % à la fin de la cinquième semaine et reprenez la ration classique de foie

- **A partir de la sixième semaine de gestation:**

Vous pouvez augmenter les quantités graduellement pour atteindre 6 à 8 % de son poids de départ. Variez le régime alimentaire : bœuf, poisson, œufs et même la panse verte (20 à 25 % maximum en déduction de la viande et des os charnus). Commencez à fragmenter les prises journalières en 4 repas par exemple.

Pour les abats privilégiez les organes filtrants : rate, rognons. Si la chienne présente des difficultés pour faire ses besoins ou si elle est constipée, réduisez le pourcentage d'os charnus à 20 ou 25 % pour faciliter l'évacuation des selles.

Ainsi le Dr Billinghamurst écrit :

*to increase the amount of cooked vegetables while, at the same time, reducing the amount of bone content in her diet. This has a laxative effect on the dog, allowing her to fully vacate her bowels, facilitating more space for the pups and contributing towards an easier birth.*

*... augmenter la quantité de légumes cuits tout en diminuant la quantité d'os contenu dans son régime. Ceci a un effet laxatif sur le chien, lui permettant de vider totalement ses intestins, en offrant plus d'espace aux chiots et en facilitant la naissance*

J'é mets toutefois des réserves sur les légumes cuits.

## **La mise bas et la lactation**

Après un effort qui aura duré entre 4 et 8 heures (parfois bien plus lors d'une première portée) et durant lequel vous aurez veillé à laisser de l'eau fraîche à sa disposition, votre chienne va avoir besoin d'énergie pour nourrir ses petits, surtout si le nombre de chiots est important.

Allaiter une portée va générer un grand besoin d'énergie pour la maman, il est donc conseillé de lui donner sa ration « à volonté » le premier mois de lactation. Ensuite vous réduirez ses rations en fonction de son appétit.

Si vous aviez baissé le pourcentage d'os charnus en fin de la gestation, repartez sur les bases « classiques » à savoir 45 % d'os charnus, ou à ce que votre chienne avait avant sa gestation. Un apport suffisant en os charnu évite les risques d'[éclampsie](#)

## **Lait maternisé**

Il arrive parfois que l'on doive se substituer à la mère, et alors on se demande dans l'urgence quoi donner. Le lait de brebis est celui qui se rapproche le plus de la composition du lait de la chienne. Toutefois si vous ne pouvez pas vous en procurer, le lait de chèvre sera un substitut tout à fait acceptable.

	Composition moyenne du lait en gramme par litre							
	Eau	Extrait sec	Matière grasse	Matières azotées			Lactose	Matières minérales
				Totales	caséine	albumine		
<b>Lait humain</b>								
	905	117	35	12-14	10-12	4-6	65-70	3
<b>Équidés</b>								
Jument	925	100	10-15	20-22	10-12	7-10	60-65	3-5
Anesse	925	100	10-15	20-22	10-12	9-10	60-65	4-5
<b>Ruminants</b>								
Vache	900	130	35-40	30-35	27-30	3-4	45-50	8-10
Chèvre	900	140	40-45	35-40	30-35	6-8	40-45	8-10
Brebis	860	190	70-75	55-60	45-50	8-10	45-50	10-12
Bufflonne	850	180	70-75	45-50	35-40	8-10	45-50	8-10
Renne	675	330	160-200	100-105	80-85	18-20	25-50	15-20
<b>Suidés</b>								
Truie	850	185	65-65	55-60	25-30	25-30	50-55	12-15
<b>Carnivores et rongeurs</b>								
Chienne	800	250	90-100	100-110	45-50	50-55	30-50	12-14
Chatte	850	200	40-50	90-100	30-35	60-70	40-50	10-13
Lapine	720	300	120-130	130-140	90-100	30-40	15-20	15-20

On trouve sur le net de nombreuses recettes de lait maternisé maison. J'attire votre attention sur l'inutilité d'ajout de sucre (mélasse, sirop d'érable, miel, sucre blanc) ou de sel. On trouve de nombreuses recettes avec ajout de jaune d'œuf, celle ci étant la plus courante : 200 ml de lait de chèvre et 1 jaune d'œuf.

J'attire votre attention sur les possibles effets allergisants du jaune d'œuf, même bio.

Quant au lait maternisé, voici ci dessous la composition de 2 laits les plus vendus

et je vous laisse juge

**L'avis de nos clients**   **Description**   **Composition**   **Mode d'emploi**   **L'avis du Vété**

**Ingrédients du lait maternisé Biocajunior**  
Lait écrémé en poudre, protéine de lactosérum, huiles végétales, protéine de lait, lactosérum, carbonate de calcium, chlorure de sodium, antioxygène

**Constituants analytiques**  
Protéines brutes 30%  
Matière grasse brute 26%  
Cendres brutes 6,5%  
Fibres alimentaires brutes 0.5%

**Présentation**  
Boîte de 400 g.  
Fourni avec 1 biberon de 60 ml, 1 mesurette, 1 tétine chaton et 1 tétine chiot.

**Informations complémentaires**  
Le Lait Maternisé Biocanina contient des vitamines : A, D, E, K, B1, B3, B6, C, PP, des oligo-éléments (Mg, Fe, Zn, Mn...). Il fournit une énergie métabolisable de 436 kcal pour 100 g. Conditionné sous azote pour une meilleure conservation.

## Lait Biocanina

**Ingrédients :**  
Lait écrémé en poudre, huiles végétales (palme, coprah), lactosérum en poudre, lactosérum partiellement délactosé en poudre, amidon de blé, carbonate de calcium, chlorure de sodium.

**Constituants analytiques :**  
Protéines brutes 25%  
Matières grasses brutes 24%  
Cendres brutes 7%  
Fibres alimentaires brutes 0.2%

**Additifs :**  
Fer 60 mg/kg, cobalt 0,25 mg/kg, zinc 60 m/kg, manganèse 50 mg/kg, iode 1 mg/kg, selenium 0,36 mg/kg, vitamine A 11250 UI/kg, vitamine D3 2000 UI/kg, vitamine E 40 mg/kg, vitamine K3 1,25 mg/kg, vitamine B1 3,75 mg/kg, vitamine C 60 mg/kg, DL-méthionine, antioxygène.

## Lait TVM

### Le sevrage des chiots

A trois semaines, les chiots sont de plus en plus actifs et il est temps pour eux de goûter à autre chose que le lait de leur mère. C'est le début du sevrage alimentaire. Il se peut que votre chienne ait déjà commencé par elle même en régurgitant quelques morceaux de viande. Nous vous proposons deux programmes ci-dessous qui sont juste des exemples de ce qu'il est possible de faire. Bien entendu vous adapterez les étapes en fonction de vos observations et des chiots.

## Méthode 1

### ▪ **Trois semaines**

C'est le premier contact avec une alimentation solide. Débutez avec du poulet mixé, sans aucun ajout. Pas de lait de chèvre (sauf éventuellement pour aider au transit des chiots), ni œuf, ni miel ou tout autre « recette maison » :

Jour 1 : une petite quantité en un repas de poulet mixé

Jour 2 : 2 repas de poulet

Jour 3 : 3 repas de poulet

Jour 4 : 4 repas de poulet

Jour 5 : 4 repas avec introduction d'une nouvelle viande que mange votre femelle et os mixés ou panse verte

Jour 6 : 5 repas avec 2 viandes et os mixés (20 % d'os charnus pour commencer).

Jour 7 : 5 repas et introduction d'une nouvelle viande sans oublier les os mixés. Les chiots tètent toujours leur mère en complément des repas solides. Surveillez les selles et donnez accès à une écuelle d'eau fraîche. Adaptez les quantités en fonction de ce que les chiots laissent ou non dans la gamelle.

### ▪ **Quatre semaines**

Durant cette semaine, vous allez augmenter les quantités de viandes et os mixés. Vous introduirez une nouvelle viande. Les chiots alternent tétés et environ 5 repas solides. En milieu de semaine vous ne mixez plus, vous coupez en morceaux.

### ▪ **Cinq semaines**

Vous augmentez les quantités de nourriture solide. En milieu de semaine (16 ème ou 17 ème jour de sevrage) vous introduisez les os charnus entier, comme les dos de poulet ou les cailles. Vous introduisez une nouvelle viande. Les tétés se font moins fréquentes.

### ▪ **Six semaines**

Les chiots peuvent désormais passer à 4 repas solides. Cette semaine sera celle de l'introduction des abats. Les chiots tètent encore.

### ▪ **Sept semaines**

C'est l'introduction du poisson et des œufs. Les tétés se raréfient.

- **Huit semaines**

Les chiots mangent désormais comme les adultes. Vous pouvez passer à 3 repas par jour. La mère ne les allaite plus mais le travail de sociabilisation se poursuit jusqu'à au moins 12 semaines.

## Méthode 2

- **Trois semaines**

Durant les introductions des viandes sur cette semaine vous ajouterez du lait de chèvre pour favoriser le transit (250 g de lait pour 1 kg de viandes)

Jour 1 : un repas de poulet haché

Jour 2 : 2 repas de poulet haché

Jour 3 : 3 repas de poulet haché (3/4) et introduction d'une viande rouge bœuf ou porc haché (1/4)

Jour 4 : 3 repas moitié poulet haché et bœuf ou porc haché

Jour 5 : 3 repas poulet haché (1/4) et bœuf ou porc haché (3/4)

Jour 6 : 3 repas poulet haché ou bœuf (ou porc) haché à votre convenance

Jour 7 : 3 repas poulet haché ou bœuf (ou porc) haché à votre convenance. Les chiots têtent toujours leur mère en complément des repas solides. Surveillez les selles et donnez accès à une écuelle d'eau fraîche. Adaptez les quantités en fonction de ce que les chiots laissent ou non dans la gamelle.

- **Quatre semaines**

Durant cette semaine, vous allez introduire la panse verte puis le foie.

- **Cinq semaines**

Vous augmentez les quantités de nourriture solide (environ 10 % du poids des chiots et vous rajoutez en fonction de leur appétit). Vous introduisez le poisson, mixé les deux premiers jours pour qu'il soit accepté plus facilement, puis entiers. Privilégiez les petits poissons types sprats ou sardines en gardant le même poisson lors de l'introduction. Les tétées se font moins fréquentes.

- **Six semaines**

Les chiots peuvent désormais passer à 3 repas solides. Cette semaine sera celle de l'introduction des os charnus entiers. Vous pouvez choisir entre

coffre de lapin ou carcasses de caille pour des chiots de petites et moyennes races ou directement des dos de poulet pour des chiots de grandes races (au delà de 25 kg à l'âge adulte). Les tétées se raréfient.

- **Sept semaines**

C'est l'introduction de nouvelles viandes. Les chiots ne tètent plus

- **Huit semaines**

Les chiots mangent désormais comme les adultes. Vous pouvez passer à 2 repas par jour.

## **Précautions**

- Ne complétez pas votre chienne en calcium
- Ne donnez pas d'huile de foie de morue
  
- Si vous souhaitez donner des mix de fruits et légumes, il vous faudra **éviter** certaines plantes et herbes

- **Pendant la gestation**

- **L'ortie** : contenant de la sérotonine dans le dard urticant de ses feuilles et qui peut stimuler les contractions de l'utérus. Cependant elle a un effet galactogène intéressant durant la lactation

- **Le persil** : son principal principe actif l'[apiol](#) est connu pour ses propriétés abortives

- **Pendant la lactation**

- **Le persil** : [l'apigénine et la lutéoline](#) présentes en quantités importantes dans ses feuilles sont facteurs d'une inhibition partielle de la prolactine, l'hormone responsable de la lactation

Source [1](#)

Source [2](#)

Source [3](#)

Infos lait : [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)

<http://ansci.illinois.edu/static/ansc438/Milkcompsynth/milkcompsynthresources.html>