

# Les maladies du gibier

## La maladie d'Aujeszky



Tirant son nom du vétérinaire hongrois qui l'a découvert en 1902, cette maladie touche les carnivores les ruminants et les équidés. Il s'agit d'une maladie virale due à un herpes le *Suid Herpesvirus 1*. Cette maladie est excrétée par les **sangliers**, seuls réservoirs de la maladie en France, via leurs sécrétions nasales et buccales.

Les porcins et chiens de chasse seront contaminés par contacts alors que les ruminants et équidés le seront « *via les sols ou objets contaminés. Cette contamination est toutefois exceptionnelle* ». ([Source](#)).

Les chats et les chiens le seront par ingestion d'abats et de viandes contaminés.

On appelle cette maladie la pseudo - rage car elle présente les mêmes symptômes : abattement soudain, atteintes du système nerveux. Son incubation est de 2 à 6 jours. On remarque un prurit caractéristique, des convulsions, puis une paralysie menant au décès de l'animal en 48 heures. ([Source](#))

## La trichinose ou trichinellose



Elle est causée par un nématode (ver rond) le *Trichinella spiralis*. Ce petit ver s'enkyste dans les muscles de son hôte et ne provoque aucun trouble. On le retrouve chez le **sanglier** et le **cheval**.

Chez le chien la trichinose provoque les mêmes symptômes que chez l'homme : vomissements, diarrhées, troubles

musculaires.

Il est à noter que ce parasite n'est pas sensible à la congélation. ([Source](#))

## La tularémie



Causée par une bactérie *Francisella tularensis*, cette maladie affecte principalement les **lièvres** soit via une tique soit par contact avec un animal infecté. Les chiens et chat seront contaminés par contact.

Chez le chat les symptômes que l'on note sont : fièvre, perte d'appétit, une

indifférence, des ulcérations de la langue ou de la muqueuse buccale ([Source](#))

Le chien semble moins sensible à cette affection on observera alors une fièvre soudaine et un écoulement nasal et oculaire. ([Source](#))

## La fasciolose ou distomatose



C'est une maladie parasitaire causée par *Fasciola hepatica*, un trématode ou une grande douve du foie. Elle infecte principalement les **orignaux** et les **wapitis**, et est présente surtout dans les différentes provinces du Canada. Toutefois la population de **chevreuils** française est également touchée. La viande n'est pas

affectée par le parasite.

